



ULBRA
CAMPUS TORRES

ISSN 1678-1740

<http://ulbratorres.com.br/revista/>

Torres, Vol. II - Dezembro, 2016 - Dossiê Anais de Eventos ULBRA Torres

Submetido em: Jul/Ago/Set, 2016

Aceito em: Out/2016

LIFTING OROFACIAL CIRÚRGICO EM ODONTOLOGIA: Relato de Caso

Moacyr de Araújo Pires Neto¹
Julia Itzel Acosta Moreno Vinholes²

Resumo

A pele é considerada o maior órgão do corpo, com atribuições de relevante importância. É constituída por duas camadas principais: a epiderme, e a derme. Contem uma quantidade de tecido adiposo de espessura variável. As rugas são sulcos ou pregas na pele, que aparecem por efeito principalmente do avanço da idade. Produzem-se normalmente pela perda de flexibilidade dos estratos superficiais e pela falta de hidratação das capas mais profundas da pele. Com o avançar da idade, as rugas produzem-se de forma progressiva em virtude de um descaimento da junção dermopidérmica, que pouco a pouco perde sua ancoragem e sua adesão com fibras elásticas da derme superficial que faz uma subtensão na rede das fibras de colágeno. Métodos minimamente invasivos são procurados para diminuir os efeitos do tempo, dentre eles estão a aplicação da toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e os fios de sustentação. A implantação dos fios de sustentação é um procedimento pouco invasivo de correção facial, que apresenta resultados satisfatórios. Ele proporciona a auto-sustentação dos tecidos faciais, recupera volumes da face, reduz rugas e redefine o rosto. O objetivo deste trabalho é apresentar dois relatos de caso sobre a técnica de fios de sustentação (lifting facial). A técnica de introdução dos fios é simples. Primeiro realiza-se a marcação das linhas de passagem dos fios, assepsia e anestesia. Então a passagem da cânula no tecido adiposo profundo acima da camada do tecido muscular, A captura do fio é realizada com o instrumento adequado. É feita sua aderência ao tecido subcutâneo. Corta-se o excesso de fio e realiza os curativos. Os resultados são divididos em precoces, real e final. Onde o precoce é o que ocorre imediatamente após o procedimento até vinte e quatro horas, o real é o que se observa após duas semanas e o final

¹ Aluno do Curso de Odontologia da ULBRA Torres

² Professora do Curso de Odontologia da ULBRA Torres

ocorre até oito semanas, pois a pele já produziu todo o colágeno e toda a reação inflamatória.

Palavras-Chave: Rejuvenescimento; Epiderme.